



Морской зеренок (*Solen vagina*) — до 15 см, иногда его называют «ногти русалки». Зарывается в песок до 1 метра в глубину. Его все меньше — съедает рапан.




Мидия среди земноморская (*Mytilus galloprovincialis*) — до 12 см, деликатес. Ее специально выращивают на морских плантациях.



Гребешок зерноморский (*Flexopecten ponticus*) — до 7 см, вид на грани исчезновения — съедает рапан. Гребешки умеют перелетать над дном, хлопая створками.



Рапан (*Rapana venosa*) — до 15 см, самая крупная улитка Черного моря, хищник. На его родине в Тихом океане их поедают морские звезды, которых в Черном море нет. (А. Вершинин).



Устрица съедобная (*Ostrea edulis*) — до 12 см, вымерший вид, съеденный рапаном.

Телефон горячей линии: +7 918 4901812
E-mail: utrishgpz@mail.ru
www.utrishgpz.ru

В буклете использована коллекция, собранная на анапской пересыпи в районе станции Благовещенской, а также на песчаном пляже г. Анапа.
 Составители: Татьяна Артёменко, Алла Письменная
 Фото: Татьяна Чакрян
 Рецензент: д.б.н. Ольга Ложниченко
 Дизайн: Екатерина Новосельцева



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «УТРИШ»



Ракушки Черного моря

Ракушки — это домики двусторчатых или брюхоногих моллюсков (улиток). Они строят их сами из солей морской воды. Растет моллюск — растет и раковина. Она и защита, и скелет беспозвоночных моллюсков. А еще — красота, как будто специально созданная для наших глаз.

В этом буклете представлены, конечно, не все ракушки, которые можно найти на черноморских пляжах Анапы. Перед Вами экземпляры коллекции, собранной на анапском песчаном пляже и анапской пересыпи в районе станицы Благовещенской.

Многие раковины, которые море выбрасывает на берег, потерты о песок и биты камнями, они отличаются от тех, что носят на себе живые моллюски. Но все они замечательны.

Чёрное море молодое, оно все время меняется. Одни моллюски исчезают, но появляются новые.

Триция сетчатая (*Tritia reticulata*) — до 3 см, массовый вид, живет в основном на камнях, но встречается и на песке, и на ракушечнике. Раки-отшельники диогены используют их как домики.



Венерка (*Venus gallina*) — до 4 см, массовый вид прибрежных песков. Цвет беловатый, кремовый или светло-желтый, обычно с тремя красно-коричневыми лучами.



Скафарка неравная (*Scapharca inaequalis*) — до 8 см. Очень древний моллюск, родина — моря Индокитая. В Черном море с 1960-х г. В настоящее время, вытесняет из донных прибрежных сообществ песка венерку.



Донакс обрезанный (*Donax trunculus*) — до 4 см, очень многочисленный вид, зарывается в песок у самого берега.



Сергиевигка съедобная (*Cerastoderma lamarcki*) — до 7 см, стала очень редкой, живых моллюсков ученые не находили уже несколько лет.